

# FOSFONEURIN

Energizante  
Psicofísico

## JARABE

## USO ORAL

### FORMULA

Cada 100 mL contiene:

Vitamina B12.....50 mcg  
Vitamina B1 .....0,010 g  
Glicerofosfato de Magnesio.....1 g  
Glicerofostato de Sodio.....2 g  
Glicerofosfato de Potasio.....1 g  
Excipientes.....C.S.

### INDICACIONES

Esta indicado en tratamiento de la fatiga, agotamiento. Estimulante de la memoria y el apetito, astenia, coadyuvante en el tratamiento del alcoholismo crónico, convalecencia, surmenage.

### POSOLOGIA

Niños menores: 2,5 mL. 3 veces al día.

Niños Mayores: 5 mL, 3 veces al día.

Adultos: 10 mL, 3 veces al día.

### DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

1 a 2 semanas, a criterio del médico.

“Recurrir al médico si los síntomas persisten o empeoran”

### MODO DE EMPLEO

Consumir antes de las principales comidas.

### REACCIONES ADVERSAS

Son de incidencia muy rara: rash cutáneo, prurito o sibilancias.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se recomienda no utilizar las vitaminas como sustituto de la dieta equilibrada.

Administrar con precaución a pacientes con alteración de la función renal.

### INTERACCIONES

El ácido ascórbico puede inactivar la Vitamina B12.

Con el uso simultaneo de alcohol, antibióticos aminoglucósidos y anticonvulsivos (especialmente Fenobarbital) se produce la reducción de los niveles séricos de la Vitamina B12.

Se produce la absorción de la Vitamina B12 al administrarse con Cimetidina y Ranitidina.

### TRATAMIENTO

El tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento.

### CONTRAINDICACIONES

Pacientes hipersensibles a las drogas presentes en la formulación.

Hiperfosfatemias. Enfermedad de Leber.

### RESTRICCIONES DE USO

Evaluar la relación riesgo-beneficio al administrar a pacientes sensibles

a otras cobalaminas (que se encuentran de forma natural en los alimentos) ya que pueden serlo también a la Vitamina B12 presente en la formulación.

### SOBREDOSIS

Hinchazón de la cara, labios o párpados, sibilancias, diarrea, prurito en la piel.

En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al centro nacional de toxicología del centro de emergencias medicas, sito en las calles Gral. Santos c/ Manuel Domínguez. tele: 202-113.

### CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente inferior a 30° C.

### PRESENTACION

Frascos conteniendo 120 mL y 240 mL.



Elaborado por: Laboratorios **INDUFAR CISA**  
REGENTE: Quím. Farm. Dr. Humberto Simón - Reg. Prof. N° 535  
Planta Industrial y Distribución: Calle Anahí e/ Zaavedra y Bella Vista  
Fndo. de la Mora, Zona Norte - Paraguay  
Para **BILAC S.A.** - De la Residenta N° 823 c/ Perú  
Tel.: 595-21-233 057 - Asunción - Paraguay  
Regente: Q.F. Mirtha Denise Denis Martínez - Reg. Prof. N° 4258